



Dow AgroSciences

氰氟·吡啶酯

总有效成分含量：13%
氯氟吡啶酯含量：2.1%
氰氟草酯：10.9%

剂型：乳油

微毒

农药登记证号：PD20182019

净含量：200升

生产企业名称：美国陶氏益农公司

国内办事机构：陶氏益农中国有限公司北京代表处
地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W3
办公楼1103室 邮编：100738

电话：010-8527 9199

传真：010-8527 9299

网址：www.dowagro.com.cn

陶氏益农®灵斯科·金® NOVLECT® NEOEC®

97050012

使用技术和使用方法：

作物(或范围)	防治对象	制剂用药量	使用方法
水稻田(直播)	一年生杂草	60-80毫升/亩	茎叶喷雾

1.本品在水稻直播田应于秧苗4.5叶即1个分蘖可见时，同时稗草不超过2个分蘖时期施药。
2.茎叶喷雾时，用水量15-30升/亩，施药时可以有浅水层，需确保杂草茎叶2/3以上露出水面，施药后24小时至72小时内灌水，保持浅水层5-7天，切勿淹没秧心。3.施药量按稗草密度和叶龄确定，稗草密度大、草龄大，使用上限用药量。4.预计2小时内有降雨请勿施药。
5.稻稗对本品敏感度中等，建议采用混剂进行防除，具体请咨询当地植保部门和经销商。
6.每季最多使用1次，施药至收获间隔期60天。

产品性能(用途)：

本品为混剂，其中含有芳香基吡啶甲酸类氯氟吡啶酯和芳氧苯氧丙酸类氰氟草酯，茎叶喷雾可以有效防除水稻田中的稗草、千金子、阔叶杂草和一年生莎草。

注意事项：

1. 使用前充分摇匀，配药时应尽量冲洗出包装内的药剂，以免浪费药剂或造成用药量不足。
2. 严格按照推荐剂量施用，请勿擅自增加使用剂量，施药务必均匀，避免重施漏施，擅自增加剂量或者重喷可能会影响作物正常生长。3. 任何会影响到作物健康的逆境或环境因素如极端冷热天气干旱冰雹等，可能会影响到药效和作物耐药性，不推荐施用。某些情况下如不利的天气、水稻不同品种敏感性差异，施药后水稻可能出现暂时性药物反应如生长受到抑制或叶片畸形，通常水稻会逐步恢复正常生长，不影响水稻产量。4. 不宜在缺水田、漏水田及盐碱田的田块使用。不推荐在秧田、制种田使用。缓苗期，秧苗长势弱，存在药害风险，不推荐使用。弥雾机常规剂量施药可能会造成严重药物反应，建议咨询当地植保部门或先试后再施用。5. 不能和敌稗、马拉硫磷等药剂混用，施用本品7天内不能再施马拉硫磷，与其它药剂和肥料混用需先进行测试确认。6. 避免漂移到邻近敏感阔叶作物如棉花、大豆、葡萄、烟草、蔬菜、桑树、花卉、观赏植物及其它非靶标阔叶植物。7. 使用本品时应穿长衣长裤、靴子、戴手套、眼镜、口罩防护用具(见图形标识)，避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水等。施药后应及时洗手和洗脸等。8. 本品对水生动物毒性低，远离水产养殖区、河塘等水体施药。禁止在河塘等水体中清洗施药器具，鱼或虾蟹套养稻田禁用。施药后的田水不得直接排入水体。9. 严格多次清洗喷药器械避免药械喷管喷头中残存药剂以后使用药械施药导致其它敏感作物受到影响和伤害，废弃药液时，切忌污染水源。用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。10. 请严格按照标签说明使用。如需业务和技术上的支持，请即与本公司客户服务中心联系。11. 如果您要将本产品用于出口农产品，请参照相应进口国的相关标准使用。12. 避免孕妇及哺乳期的妇女接触。

中毒急救：

1. 可能的中毒症状：短暂接触可能引起轻微皮肤刺激，局部会发红。可能引起眼睛刺激。
2. 皮肤接触：脱去被污染的衣物，立刻以大量清水冲洗皮肤15到20分钟。拨打中毒急救电话或就医诊治。
3. 眼睛接触：保持眼睛张开，用水缓慢轻柔地淋洗15到20分钟。如佩戴隐形眼镜，开始冲洗5分钟后将其摘下，继续淋洗眼睛。拨打中毒急救电话或就医诊治。
4. 吸入：将患者转移至空气新鲜处。如无自主呼吸，请寻求急救帮助或救护车，然后给予人工呼吸。如果采用口对口人工呼吸，需使用救护人员保护装备(袋装面罩等)。拨打中毒急救电话或就医诊治。
5. 误食：拨打中毒急救电话或就医诊治。如能吞咽则让其啜一杯水。未经中毒急救中心或医生允许勿催吐。勿给失去知觉者喂食任何东西。
6. 给医护人员的提示：无特定解毒剂，请医生对症治疗。拨打中毒急救电话或就医时，请携带产品包装或标签。

24小时中毒急救热线：(021) 5838 2516

储存和运输：

1. 本品应密封贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。2. 存放于儿童触及不到之处，并加锁。3. 勿与食品、饮料、粮食、饲料等其他商品同贮同运。贮存或运输时堆层不得超过规定，注意轻拿轻放，以免损坏包装，导致产品泄漏。

陶氏益农农产品咨询服务电话：400 880 5588

97033786 1803

原产地：美国

质量保证期：2年

生产日期和批号：见桶身



除草剂